

اما اگر برای بار اول از این دستگاه استفاده نمی‌کنید، پیچ قرمز رنگ را تا انتها چرخانده و سپس خلاف جهت، این کار را انجام دهید (در این پروسه یک بار صدای کلیک شنیده می‌شود) و یک دوز دارو آماده مصرف شما می‌گردد.

اکنون با بازدمی عمیق، نفس خود را بیرون داده و دهانه‌ی دستگاه را داخل دهان گذاشته و لب‌هایتان را دور آن محکم ببندید.

اکنون با یک دم عمیق، ذرات پودر را به مجاری تنفسی و ریه منتقل کنید و در صورت امکان چند ثانیه نفس خود را حبس کنید.

در انتها درپوش دستگاه را در جای خود قرار دهید.



اجزای دستگاه سیمبیکورت توربوهاالر

- ✓ درپوش
- ✓ دهانی
- ✓ نشانگر دوز
- ✓ پیچ

نحوه استفاده از دستگاه سیمبیکورت توربوهاالر:

ابتدا می‌بایست درپوش را به صورت چرخشی از روی بدنه بردارید و اسپری را به صورت عمودی رو به بالا نگه دارید (پیچ قرمز پایین قرار می‌گیرد).

اگر دستگاه را برای اولین بار استفاده می‌کنید، ابتدا با یک دست بدنه دستگاه را گرفته و با دستی دیگر، پیچ قرمز رنگ را تا انتها بچرخانید و سپس خلاف مرحله اول این کار را انجام دهید؛ در قسمتی از انجام این پروسه، صدای کلیک شنیده می‌شود. سپس این کار را یک بار دیگر انجام دهید (مجموعاً ۲ مرتبه) تا دستگاه شما آماده مصرف شود.

سیمبیکورت نام تجاری دارویی است که از دو جزء بودزوناید و فورمترویل تشکیل شده است.

بودزوناید یک کورتیکواستروئید استنشاقی بوده که باعث مهار پروسه‌های التهابی از طریق مکانیسم‌های مختلف می‌شود.

فورمترویل نیز آگونیست طولانی اثر رسپتور بتا ۲ است که باعث ریلکس شدن عضلات صاف برونش شده در حالی که اثر اندکی بر روی ضربان قلب دارد.

کاربردهای بالینی داروی سیمبیکورت:

از این دارو می‌توان در درمان بیماری آسم و بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) استفاده کرد.

اشکال دارویی موجود در ایران

پودر استنشاقی سیمبیکورت با دوزهای متفاوتی در بازار دارویی موجود است و متداول‌ترین دوزهای موجود در ایران شامل دوزهای ۱۶۰/۴.۵ و ۳۲۰/۹ می‌باشد.







بیمارستان نیکان سپید
SEPID NIKAN HOSPITAL

استفاده از اسپری سیمبیکورت

بخش مراقبت های دارویی

www.sepid.nikan.hospital



قابل توجه است که ذرات پودر داروی سیمبیکورت طعم و بوی خاصی ندارد، لذا ممکن است متوجه ورود دارو به ریه نشوید و این مورد امری طبیعی است.

در نظر داشته باشید پس از هر بار استفاده از دارو، حتما دهان خود را با آب بشوید. هفته ای یک بار با یک دستمال خشک، محل دهانی دستگاه را تمیز کنید.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی شایع دارو: سردرد، افزایش ضربان قلب، لرزش، سرفه، گرفتگی صدا، آزردهی دهان و یا حلق

عوارض جانبی غیر شایع: تهوع، اختلال خواب، بی قراری، عصبانیت، گیجی، گرفتگی عضلانی

عوارض جانبی نادر: کبودی پوست، اختلالات رفتاری یا افسردگی

شرایط نگهداری دارو:

در نظر داشته باشید که دارو را دور از دسترس اطفال نگهداشته، همواره درپوش دستگاه را پس از استفاده ببندید و دارو را در دمای بین ۱۵- ۳۰ درجه سانتی گراد و در جای خشک قرار دهید.