


## IVP (پیلوگرام داخل وریدی)

این تصویربرداری جهت بررسی کلیه و مجاری ادراری از طریق تزریق ماده حاجب انجام می‌شود و درحین عبور ماده حاجب چندین عکس رادیولوژی از شکم و لگن گرفته می‌شود.



## آمادگی جهت انجام IVP

- در زمان پذیرش همراه داشتن آزمایش جدید اوره و کراتینین الزامی می‌باشد.
- روز قبل از انجام گرافی نهار سبک ( مثل سوپ ساده بدون سبزیجات و بدون مواد نفخ آور) میل نمایید.
- شب قبل از انجام گرافی ساعت ۷ شب شام سبک (مثل سوپ ساده بدون سبزیجات و بدون مواد نفخ) میل نمایید.
- از ساعت ۶ عصر روز قبل از انجام گرافی تا ساعت ۱۱ شب هر ۲ ساعت دو عدد قرص دایمتیکون بجوید.
- ساعت ۸ شب یک شیشه روغن کرچک میل نمایید. اگر در میل کردن آن مشکل دارید می‌توانید از نوع طعم دار بدون بو استفاده کنید.
- بعد از خوردن روغن کرچک هیچ غذایی میل نکنید و فعالیت داشته باشید و چند لیوان آب بنوشید تا شکم شما حداقل ۵ بار کار کند.


- صبح روز انجام گرافی ساعت ۶ الی ۷ صبح دو عدد قرص دایمتیکون دیگر بجوید.
- بیمارانی که توان مصرف روغن کرچک را ندارند می‌توانند در ساعت ۱۴ و ۱۸ روز قبل از آزمون هر دو ساعت ۲ عدد قرص بیزاکودیل مصرف کنند (هر ۲ ساعت ۲ عدد).

## زمان مراجعه

- ساعت ۳:۰۸ صبح روز انجام گرافی ناشتا مراجعه فرمایید.

## نکته

- در صورتی که قرص متفورمین مصرف می‌نمایید و مشکل کلیوی دارید حتما قبل از ثبت نوبت تصویربرداری هماهنگی لازم با کارشناس جهت راهنمایی زمان قطع قرص متفورمین به عمل آورید.





## تصویربرداری کلیه (IVP)

آذر ۱۴۰۴

تاریخ بازنگری: سالیانه



بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL | سپید | SEPID

تهیه شده در واحد آموزش سلامت و روابط عمومی

## تصویربرداری

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۵۰۳۳

## اورژانس

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۵۰۰۴

## کلینیک

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۹



برای نصب و عضویت اسکن کنید

بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL | سپید | SEPID

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیکان سپید

📍 تهران، اتوبان شهید بابایی، بلوار بهار، خیابان لاله

[www.sepid.nikan.hospital](http://www.sepid.nikan.hospital)

☎ تلفن: ۲۹۱۲۰۰۰۰ | Sepidnikan-hospital

## نکات بعد از انجام IVP

▪ مصرف مایعات فراوان جهت دفع ماده حاجب از کلیه ها

▪ در صورت بروز خارش، کهیر و تنگی نفس به اورژانس مراجعه کنید.

▪ در صورت تیره شدن رنگ ادرار کاهش شدید حجم ادرار به اورژانس مراجعه کنید.

▪ در صورت استفاده از قرص متفورمین جهت ادامه مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

