


FNA (نمونه برداری با سوزن ظریف از غده تیروئید) بیوپسی تیروئید)

روش انجام کار:

بعد از آنکه محل نمونه برداری مشخص شد، ناحیه گردن توسط مواد ضد عفونی کننده پاک می شود. سپس توسط یک سوزن باریک تحت هدایت سونوگرافی وارد ضایعه مورد نظر می شویم. انجام نمونه برداری ممکن است بر اساس ابعاد و تعداد ضایعات چند بار تکرار شود. لازم به ذکر است که مصرف داروی بی حسی در مورد نمونه برداری تیروئید نیاز نیست چراکه درد ناشی از داروی بی حسی نسبت به سوزن نمونه برداری ناراحت کننده تر است.



۱

آمادگی های قبل از انجام FNA

۱. موهایی زائد گردن تراشیده شده باشد.
۲. يك نفر از اقوام درجه یک همراه داشته باشید.
۳. دستور پزشک معالج را همراه داشته باشید.

زمان مراجعه

▪ ساعت ۸ صبح با همراه تمام مدارک پزشکی پیرامون بیماری و دستور پزشک مراجعه بفرمایید.

نکات

- در صورت مصرف داروهای ضد انعقادی از یک هفته قبل طبق نظر پزشک آنها را قطع کنید.
۴. مدارک قبلی در خصوص تیروئید را همراه داشته باشد. آزمایش هورمون تیروئید (T₃ و T₄)، اسکن ایزوتوپ، سونوگرافی مربوط به تیروئید، جواب پاتولوژی FNA قبلی در صورت انجام را همراه داشته باشید.


۲

توصیه های بعد از انجام آزمون

- ۱- موضع نمونه برداری را برای ۱۰ دقیقه با دست فشار دهد تا اگر مویرگی در طی عبور سوزن صدمه دیده بود بسته شود.
- ۲- نمونه برداری به مسیر گوارش ارتباطی ندارد. لذا هیچ محدودیتی برای خوردن وجود ندارد، درد حاصل از بلع به علت حرکت غده تیروئید و تحریک جزئی به عضلات مسیر عبور سوزن است و در صورت درد مسکن های معمولی باعث کاهش آن می شود.
- ۳- نمونه ها را می توانید در هوای معمول اتاق نگه داشت و لازم به گذاشتن آنها در یخچال نیست فقط در معرض آفتاب قرار نگیرد. هر چه زودتر نمونه ها به آزمایشگاه برده شود بهتر خواهد بود.



۳



نمونه برداری از غده تیروئید (FNA)

آذر ۱۴۰۴


تاریخ بازنگری: سالیانه



بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL | سپید | SEPID

تهیه شده در واحد آموزش سلامت و روابط عمومی



برای نصب و عضویت اسکن کنید

بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL | سپید | SEPID

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیکان سپید

تهران، اتوبان شهید بابایی، بلوار بهار، خیابان لاله

www.sepid.nikan.hospital

تلفن: ۲۹۱۲۰۰۰۰ | Sepidnikan-hospital

نکته:

- در رابطه با شروع مجدد داروهای ضد انعقادی در صورت سابقه ی مصرف با پزشک خود مشورت کنید

- در صورت خونریزی و تب و لرز به اورژانس بیمارستان مراجعه فرمایید

تصویربرداری

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۵۰۳۳

اورژانس

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۵۰۰۴

کلینیک

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۹