


## نحوه انجام

بیوپسی از طریق مقعد و تحت هدایت سونوگرافی بایبی حسی موضعی و بی‌تحت بیهوشی خفیف و کوتاه مدت صورت می‌گیرد. معمولاً چند نمونه سوزنی از قسمت‌های مختلف غده پروستات گرفته شده و جهت بررسی آزمایشگاهی ارسال می‌شود.

نمونه‌ها در دمای معمولی اطاق قابل نگهداری می‌باشد و نیازی به دمای یخچال ندارد و ارسال بلافاصله آن‌ها به آزمایشگاه ضروری نیست هرچند که هر چه زودتر باشد بهتر است.



## آمادگی‌های قبل از انجام بیوپسی پروستات

۱. حدود ۶ ساعت ناشتا باشید.
۲. انجام آزمایش‌های انعقادی مثل CBC ، PT ، PTT قبل از انجام بیوپسی صورت گیرد و در صورت مختل بودن توسط پزشک معالج کنترل می‌شود.
۳. در صورت مصرف داروهای ضد انعقادی مصرف آن‌ها از یک هفته قبل طبق دستور و نظر پزشک معالج قطع شود.
۴. در صورت حساسیت به داروها به پزشک اطلاع داده شود.
۵. پاک بودن و خالی کردن فضای داخل روده از مدفوع.
۶. موهای زائد اطراف مقعد تراشیده شود.



## زمان مراجعه

- طبق نوبت داده شده توسط پذیرش، همراه تمام مدارک پزشکی در رابطه با بیماری (MRI پروستات و تمامی مدارک تصویر برداری قبلی) و دستور پزشک مراجعه بفرمایید.

## نکات

- همراه داشتن نسخه پزشک درخواست کننده بیوپسی.
- همراه داشتن نتایج آزمایش مدفوع و آنتی بیوگرام و آزمایش‌های خون. (در صورت دستور پزشک)
- کپی نسخه دارویی تجویز شده که مصرف آن قبل از انجام بیوپسی می‌باشد.
- پرکردن فرم رضایت نامه و امضاء و ثبت اثر انگشت توسط بیمار و همراه.
- همراه داشتن یک مرد و یا دو زن از اقوام درجه یک بیمار (بعلت مسائل قانونی) و همراه داشتن کپی شناسنامه یا کارت ملی همراه درجه یک بیمار.



## نمونه برداری (بیوپسی) پروستات

آذر ۱۴۰۴

تاریخ بازنگری: سالیانه



بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL | سپید | SEPID

تهیه شده در واحد آموزش سلامت و روابط عمومی



برای نصب و عضویت اسکن کنید

بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL | سپید | SEPID

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیکان سپید

تهران، اتوبان شهید بابایی، بلوار بهار، خیابان لاله

[www.sepid.nikan.hospital](http://www.sepid.nikan.hospital)

تلفن: ۲۹۱۲۰۰۰۰ | Sepidnikan-hospital

توصیه های بعد از انجام نمونه برداری

- 1- ضروریست حدود دو ساعت بیمار تحت نظر قرار گیرد بعد از ترخیص نیاز به محدودیت در فعالیت های روزمره نیست.
- 2- حدود دو ساعت روی سطح سفت بنشینند .
- 3- تا دو هفته امکان دارد در مدفوع ، مایع منی و ادرار مقداری خون دیده شود. اگر این مدت و یا میزان خونریزی بیشتر شد باید به پزشک معالج مراجعه نمایند.
- 4- تا ۵ روز بعد از انجام بیوپسی آسپرین و مسکن های غیر استروئیدی مصرف نشود (طبق نظر پزشک معالج).
- 5- تا دو روز امکان تب خفیف وجود دارد ولی در صورت لرز، باید سریعاً به پزشک معالج مراجعه کنید .
- 6- تا دو روز از غذاهای سبک مثل سوپ استفاده شود .

تصویربرداری

۰۲۱۲۹۱۲۵۰۳۳ ☎

اورژانس

۰۲۱۲۹۱۲۵۰۰۴ ☎

کلینیک

۰۲۱۲۹۱۲۹ ☎