

## بیوپسی (نمونه برداری) از کلیه

نمونه برداری از کلیه و یا ضایعات کلیوی توسط سوزنی پاریک و تحت هدایت سونوگرافی و یا CT scan انجام می شود. بعد از مشخص کردن محل بیوپسی روی پوست بیمار، بی حسی موضعی ایجاد می شود. سپس تحت هدایت تصویربرداری، سوزن بیوپسی از طریق پوست به محل مورد نظر در کلیه هدایت شده و پس از تهیه چند نمونه سوزنی و خارج کردن سوزن بیوپسی، جهت حصول اطمینان از عدم وجود هر گونه مشکل بعد از چند ساعت یا یک روز بیمار ترخیص می شود.



## آمادگی های قبل از انجام بیوپسی کلیه

- نسخه پزشک درخواست کننده را به همراه بیاورید .  
- پر کردن فرم رضایت نامه و امضاء و ثبت اثر انگشت توسط بیمار و همراه وی  
- انجام آزمایشات شامل PTT، PT و CBC در صورت درخواست پزشک.  
- انجام مشاوره بیهوشی و مشاوره پزشک متخصص قلب قبل از انجام بیوپسی در صورت درخواست پزشک  
- مدارک قبلی شامل سونوگرافی، رادیوگرافی و سی تی اسکن های قبلی را به همراه داشته باشید .  
- ۶ ساعت ناشتا باشید .  
- موهای زائد قسمت تنه شیو شده باشد.  
- در صورت استفاده از داروهای ضد انعقادی از یک هفته قبل (طبق نظر پزشک معالج) مصرف آنها قطع شود.  
- در صورت ابتلا به بیماری و یا حساسیت دارویی به پزشک و پرستاران اطلاع دهید .

## زمان مراجعه

- طبق زمان اعلام شده توسط کارشناس پذیرش و با همراه تمام مدارک پزشکی در رابطه با بیماری و دستور پزشک مراجعه بفرمایید .

## نکات

- همراه داشتن نسخه پزشک درخواست کننده بیوپسی .
- همراه داشتن نتایج آزمایش مدفوع و آزمایش های خون درخواستی پزشک.
- پر کردن فرم رضایت نامه و امضاء و ثبت اثر انگشت توسط بیمار و همراه .
- همراه داشتن یک مرد و یا دو زن از اقوام درجه یک بیمار ( بعلت مسائل قانونی ) و همراه داشتن کپی شناسنامه یا کارت ملی همراه درجه یک بیمار.





## نمونه برداری (بیوپسی) کلیه

آذر ۱۴۰۴

تاریخ بازنگری: سالیانه



بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL سپید | SEPID

تهیه شده در واحد آموزش سلامت و روابط عمومی

## تصویربرداری

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۵۰۳۳

## اورژانس

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۵۰۰۴

## کلینیک

☎ ۰۲۱۲۹۱۲۹



برای نصب و عضویت اسکن کنید

بیمارستان نیکان

NIKAN HOSPITAL سپید | SEPID

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیکان سپید

تهران، اتوبان شهید بابایی، بلوار بهار، خیابان لاله

[www.sepid.nikan.hospital](http://www.sepid.nikan.hospital)

تلفن: ۰۲۹۱۲۰۰۰۰۰ | Sepidnikan-hospital

توصیه های بعد از انجام نمونه برداری

-شاید لازم باشد طبق نظر پزشک چند ساعت تحت نظر باشید.

-در صورت نیاز داروهای مسکن تجویز شده توسط پزشک را مصرف نماید.

بعد از ترخیص به مدت ۲۴ ساعت حمام نرفته و پانسمان را بزدارید بعد از ۲۴ ساعت پانسمان را برداشته و استحمام کنید.

-گاهی ممکن است بیمار بر اساس وضعیت برای مدتی در بخش مراقبت های ویژه بستری شود.

-تا پنج روز بعد از بیوپسی با مشورت پزشک معالج (در صورت سابقه مصرف) از مصرف داروهای ضد انعقادی پرهیز کنید.

-تایک هفته از فعالیت های سنگین خودداری کنید

## عوارض احتمالی

▪ خونریزی در ادرار که گذرا می باشد و باید مصرف آب زیاد داشته باشید تا لخته خون مسیر ادرار را

مسدود نکند.

▪ احتمال تب و لرز وجود دارد جهت پیشگیری و

کاهش احتمال آن قبل از بیوپسی آنتی بیوتیک تجویز می گردد.

▪ در صورت ادامه تب و لرز و خونریزی واضح از ناحیه بیوپسی و یا خون واضح در ادرار به اورژانس

بیمارستان مراجعه کنید.